



Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Institutt for matematiske fag

TMA4245 Statistikk Eksamen juni 2015

Løsningsskisse

Oppgave 1

- a) På figuren er det vanskelig å se noen trend for samsvarende verdier for de to variablene X og Y . Variablene kan se ut som uavhengige. Derfor vil korrelasjon være (tilnærmet) 0.

$$EX \approx 2, \sqrt{\text{Var}(X)} \approx 1, EY \approx 0, \sqrt{\text{Var}(Y)} \approx 1.$$

Oppgave 2

- a)

Oppgave 3

- a) $\sigma = 0.01$.

$$\mu = 0.1.$$

$$P(B) = P(|X - 0.1| > 2\sigma) = P\left(\left|\frac{X - 0.1}{\sigma}\right| > 2\right) =$$

$$= P(|Z| > 2) = 2P(Z < -2) = 2 \cdot 0.0228 = \underline{0.0456}$$

$$P(A) = P(|X - 0.1| > \sigma) = P\left(\left|\frac{X - 0.1}{\sigma}\right| > 1\right) =$$

$$= P(|Z| > 1) = 2P(Z < -1) = 2 \cdot 0.1587 = 0.3174$$

$$P(B|A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} = \frac{P(B)}{P(A)} = \frac{0.0456}{0.3174} = \underline{0.1437}$$

$$\mu = 0.11.$$

$$P(|X - 0.1| > 2\sigma) = P(X - 0.1 < -2\sigma)P(X - 0.1 > 2\sigma) =$$

$$= P(X - 0.11 < -2\sigma - 0.01) + P(X - 0.11 > 2\sigma - 0.01) =$$

$$= P\left(Z < -2 - \frac{0.01}{\sigma}\right) + P\left(Z > 2 - \frac{0.01}{\sigma}\right) = P(Z < -3) + P(Z > 1) =$$

$$= P(Z < -3) + P(Z < -1) = 0.0013 + 0.1587 = \underline{0.16}$$

b) Rimelighetsfunksjonen blir

$$L(\sigma^2) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} \exp\left(-\frac{(X_i - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) = (2\pi)^{-\frac{n}{2}} (\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2\right).$$

Logaritme

$$\ln L = -\frac{n}{2} \ln(2\pi) - \frac{n}{2} \ln(\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2.$$

Deriverer (mhp σ^2)

$$\frac{\partial \ln L}{\partial(\sigma^2)} = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2(\sigma^2)^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2.$$

Løser ligningen

$$\frac{\partial \ln L}{\partial(\sigma^2)} = 0$$

. Løsningen

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$$

er SME (en positiv løsning og $L(\sigma^2) \rightarrow 0$ når $\sigma^2 \rightarrow 0$ og når $\sigma^2 \rightarrow \infty$, derfor er det maksimum og ikke minimum; alternativt kan man derivere en gang til og vise at den andre deriverte er negativ).

c) Forventningsverdien til en χ^2 -fordeling med n frihetsgrader er lik n (se "Tabeller og formler i statistikk"). Så,

$$E\left[\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma^2}\right] = n, \quad E\left[\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2}\right] = n - 1$$

eller

$$E\hat{\sigma}^2 = \sigma^2, \quad ES^2 = \sigma^2$$

dvs estimatorene er forventningsrette. Igjen, ved bruk av "Tabeller og formler i statistikk" får vi at

$$\text{Var}\left(\frac{n\hat{\sigma}^2}{\sigma^2}\right) = 2n, \quad \text{Var}\left(\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\right) = 2(n-1)$$

som impliserer

$$\text{Var}(\hat{\sigma}^2) = \frac{2\sigma^4}{n}, \quad \text{Var}(S^2) = \frac{2\sigma^4}{n-1}.$$

$\hat{\sigma}^2$ er mer effektiv enn S^2 (har mindre varians). Det er fornuftig å bruke den.

d) I generelt tilfelle får man $(1 - \alpha)$ konfidensintervall på følgende måte

$$1 - \alpha = P\left(\chi_{1-\alpha/2, n}^2 \leq \frac{n\hat{\sigma}^2}{\sigma^2} \leq \chi_{\alpha/2, n}^2\right) = P\left(\frac{n\hat{\sigma}^2}{\chi_{\alpha/2, n}^2} \leq \sigma^2 \leq \frac{n\hat{\sigma}^2}{\chi_{1-\alpha/2, n}^2}\right)$$

dvs $(1 - \alpha)$ konfidensintervall er

$$\left[\frac{n\hat{\sigma}^2}{\chi_{\alpha/2,n}^2}, \frac{n\hat{\sigma}^2}{\chi_{1-\alpha/2,n}^2} \right].$$

For tallene som er gitt:

$$n\hat{\sigma}^2 = 0.0018, \chi_{0.05,20}^2 = 31.410, \chi_{0.95,20}^2 = 10.851.$$

Intervallet blir [0.000057, 0.000166].

Oppgave 4

a) La $F(x)$ og $F_T(t)$ være kumulative fordelingsfunksjoner for X_i og T , henholdvis. Da er

$$F(x) = \int_0^x \frac{1}{\mu} e^{-u/\mu} du = 1 - e^{-x/\mu}, \quad x > 0$$

og

$$\begin{aligned} F_T(t) &= P(\min(X_1, \dots, X_n) \leq t) = 1 - P(\min(X_1, \dots, X_n) > t) = \\ &= 1 - P(X_1 > t, \dots, X_n > t) = 1 - P(X_1 > t) \cdot \dots \cdot P(X_n > t) = \\ &= 1 - (1 - P(X_1 \leq t)) \cdot \dots \cdot (1 - P(X_n \leq t)) = 1 - (1 - F(t))^n = 1 - e^{-tn/\mu}. \end{aligned}$$

Tilsvarende sannsynlighetstetthet er den deriverte av $F_T(t)$:

$$f_T(t) = F_T'(t) = \underline{\underline{\frac{n}{\mu} e^{-tn/\mu}}}.$$

En ser at T er eksponensialfordelt med parameter μ/n , derfor er $E(T) = \underline{\underline{\mu/n}}$ og $\text{Var}(T) = \underline{\underline{\mu^2/n^2}}$.

b)

$$\alpha = P_{\mu=1}(T \leq c_1) = 1 - e^{-nc_1},$$

derfor er

$$c_1 = \underline{\underline{\frac{1}{n} \ln \frac{1}{1-\alpha}}}.$$

c) Jo mindre μ er, desto mindre er \bar{X} i gjennomsnitt. Derfor er det fornuftig å forkaste H_0 for små verdier av \bar{X} (fordi nullhypotesa $H_0 : \mu = 1$ testes mot alternativ $H_1 : \mu < 1$). Således har forkastningsområdet formen $\bar{X} \leq c_2$. For å finne c_2 (tilnærmet) bruker vi sentralgrenseteoremet:

$$\frac{\bar{X} - E\bar{X}}{\sqrt{\text{Var}\bar{X}}} \sim N(0, 1).$$

Siden $E\bar{X} = \mu$ og $\text{Var}\bar{X} = \mu^2/n$, har vi at under H_0

$$\sqrt{n}(\bar{X} - 1) \sim N(0, 1).$$

Da

$$\alpha = P(\bar{X} \leq c_2) = P(\sqrt{n}(\bar{X} - 1) \leq \sqrt{n}(c_2 - 1)) = P(Z \leq \sqrt{n}(c_2 - 1))$$

og derfor

$$\sqrt{n}(c_2 - 1) = -z_\alpha$$

eller

$$\underline{\underline{c_2 = 1 - \frac{z_\alpha}{\sqrt{n}}.}}$$

d) Teststyrken til Test 1 er

$$\begin{aligned} 1 - \beta_1(\mu) &= P_\mu \left(T \leq \frac{1}{n} \ln \frac{1}{1 - \alpha} \right) = \\ &= 1 - e^{\ln(1-\alpha)/\mu} = 1 - (1 - \alpha)^{1/\mu}. \end{aligned}$$

Teststyrken til Test 2 er

$$\begin{aligned} 1 - \beta_2(\mu) &= P_\mu \left(\bar{X} \leq 1 - \frac{z_\alpha}{\sqrt{n}} \right) = P_\mu \left(\frac{\sqrt{n}\bar{X} - \mu}{\mu} \leq \frac{\sqrt{n}}{\mu} \left(1 - \mu - \frac{z_\alpha}{\sqrt{n}} \right) \right) = \\ &= P_\mu \left(Z \leq \frac{\sqrt{n}}{\mu} \left(1 - \mu - \frac{z_\alpha}{\sqrt{n}} \right) \right) = \Phi \left(\frac{\sqrt{n}}{\mu} - \sqrt{n} - \frac{z_\alpha}{\mu} \right). \end{aligned}$$

Test 2 er best fordi den har størst styrke dvs minst sannsynlighet av Type 2 feil mens signifikansnivå (sannsynlighet av Type 1 feil) er det samme for de to testene. For eksempel, for $\alpha = 0.05$, $n = 30$ og $\mu = 0.8$, er styrkene $1 - \beta_1 = \underline{0.06}$, $1 - \beta_2 = \underline{0.25}$.

Test 1 er en dårlig test fordi styrken er uavhengig av n dvs sannsynligheten for Type 2 feil avtar ikke når utvalgsstørrelsen vokser. En ser også at teststyrken for Test1 vil være svært liten for alle relevante verdier på α og μ .